

По эпидемическим показаниям вакцина против пневмококковой инфекции вводится:

- детям в возрасте от 2 до 5 лет,
- призывникам,
- лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких,
- лицам старшего трудоспособного возраста, проживающим в организациях социального обслуживания.

Если после вакцинации происходит инфицирование – заболевание не развивается или имеет легкое течение.

Неспецифическая профилактика заключается в соблюдении правил личной гигиены и ведении здорового образа жизни.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1
e-mail: cgon@cgon.ru;
тел.: 8 (499) 241 86 28



ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ



Пневмококковая инфекция

группа инфекционных заболеваний, вызываемых *Streptococcus pneumoniae*, или пневмококком.

Пневмококк может поражать практически все органы, вызывая отиты, синуситы, конъюнктивиты, бронхиты.

Наиболее опасные формы инфекции – пневмония, сепсис, менингит. Они могут привести к летальному исходу.

Источник инфекции - больной любой формой пневмококковой инфекции или бактерионоситель.

Пневмококк передается воздушно-капельным путем во время кашля, чихания, при разговоре.



Наиболее тяжело инфекция протекает у детей до 2-х лет, пожилых людей и у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Начальные симптомы

могут быть общими для всех форм инфекции: внезапный подъем температуры, озноб, кашель, одышка.

При пневмонии к симптомам присоединяются кашель, одышка, боли в груди.

При менингите – сильнейшая головная боль, спутанность сознания, тошнота, светобоязнь.

У пожилых людей симптомы могут быть менее специфичными.

Важно своевременно распознать начало инфекции и обратиться за медицинской помощью.

Лечение назначает только врач.



Вакцинация

единственная надежная защита от пневмококковой инфекции.

Вакцинация детей проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н по следующей схеме:

- **первая прививка в 2 месяца**
- **вторая – в 4,5 месяца**
- **ревакцинация – в 15 месяцев**

Если прививку не сделали в первые 6 месяцев жизни, то вакцинация проводится двукратно с интервалом между прививками не менее 2 месяцев.

